專案進口

同成分、同劑量藥品包裝說明

once-daily Lixiana® edoxaban

里先安®膜衣錠

原包裝 Lixiana® 30mg

粉色

圓型

DSC L30

直徑約 8 mm

日本專案進口 Lixiana® 30mg

膜衣錠

裸錠外觀

粉橘色 圓型

DSC 472

單面刻痕

直徑 8.6 mm

口溶錠

裸錠外觀

淺粉色 圓型

リクシアナ OD 30

單面刻痕

直徑 8.6 mm

僅適用於衛授食字第1150701461號函核准之專案輸入藥品

禁忌 對本品活性成分或賦形劑過敏、臨床上有重大活動性出血、合併凝血功能障礙之肝臟疾病、高出血風險的病灶或病史、控制不良的嚴重高血壓、同時使用其他抗凝血劑、以及懷孕與哺乳期間。 **警語** Lixiana® 15mg 不適用於單一治療，僅限於自 30mg 轉換至 VKA 過程中合併使用，或於 NVAF 病人中，依年齡及臨床狀況考量將劑量調整為每日一次 15mg。使用 Lixiana® 會增加出血風險，且可能致命。對於高風險族群（如高齡患者或具有合併病史者）須密切監測出血及貧血狀況；若發生嚴重出血，應立即停藥。常規實驗室檢測（PT/INR/aPTT）無法可靠反應抗凝效果，且目前無專一解毒劑，血液透析亦無效。必要時可透過抗因子 Xa 檢測協助估算藥效。需手術或介入治療時，建議於至少 24 小時前停藥；手術完成並達到止血後，應儘快恢復用藥。與影響止血之藥物併用（如阿斯匹靈［ASA］、P2Y12 抑制劑、其他抗血栓藥物、溶栓治療、SSRI 或 SNRI 類抗憂鬱藥、長期使用之 NSAIDs）會增加出血風險。不建議使用於下列族群：機械性人工心臟瓣膜患者、生物瓣置換術後三個月內（不論是否合併心房顫動）、以及中度至重度二尖瓣狹窄患者。曾有案例顯示抗凝劑相關腎病變（如急性腎損傷、血尿）。對於腎功能異常或出現血尿的病人，應加強監測。其他注意事項：Lixiana® 對駕駛及機械操作能力無明顯影響；抗凝血作用約於給藥後 1–2 小時發揮。**副作用** 常見副作用包括：流鼻血（7.7%）、血尿（6.9%）、貧血（5.3%）。

衛部藥輸字第026599號　衛部藥輸字第026601號 衛部藥輸字第026600號

Daiichi-Sankyo

台灣第一三共股份有限公司 電話: (02) 8772-2250

台北市松江路223號13樓　https://www.daiichisankyo.com.tw

里先安®膜衣錠 Lixiana F.C. Tablets 電子仿單QR Code

里先安® 60mg　里先安® 30mg　里先安® 15mg